

Avec le soutien financier de



REALISATION DU SUIVI BIOLOGIQUE DCE DES INVERTEBRES AQUATIQUES DANS LES COURS D'EAU DE GUADELOUPE


Rapport Final

BOUVIER Delphine (HYDRECO)
BARGIER Nicolas (HYDRECO)

janvier 2021

Document élaboré dans le cadre de :

DCE2020 – Domaine xxxx - Action x



- **AUTEURS**

Delphine BOUVIER, Ingénieur d'Etudes (HYDRECO), delphine.bouvier@hydrecolab.com

Nicolas BARGIER, Responsable Développement (HYDRECO), nicolas.bargier@hydrecolab.com

- **CONTRIBUTEURS**

Isabelle NASSO, Chargée d'étude DCE, (Office De l'Eau Guadeloupe), isabelle.nasso@oe971.fr

Sophie KANOR, chargée d'étude milieux aquatiques et données, (Office De l'Eau Guadeloupe), Sophie.KANOR@oe971.fr

Droits d'usage : accès libre
Niveau géographique : régional
Couverture géographique : Guadeloupe
Niveau de lecture : experts

- **REALISATION DU SUIVI BIOLOGIQUE DCE DES MACROINVERTEBRES BENTHIQUES DANS LES COURS D'EAU DE GUADELOUPE, DELPHINE BOUVIER & NICOLAS BARGIER**
- **RESUME**

La présente étude concerne le suivi de l'élément biologique « macroinvertébrés benthiques » dans les cours d'eau de la Guadeloupe dans le cadre de la mise en œuvre de la Directive Cadre sur l'Eau (DCE) pour l'année 2020. Les 20 stations concernées font partie du Réseau de Contrôle de Surveillance (RCS). Douze d'entre elles font également partie du Réseau de contrôle opérationnel (RCO) dont 3 appartiennent aussi au Réseau complémentaire. Deux stations du RCS appartiennent aussi au Réseau complémentaire. Il est à noter que la station Rivière Plessis – Vanibel (07046295) n'a pu être prélevé lors de cette session 2020. Donc, ces 19 stations ont permis d'établir l'état écologique des masses d'eau de la Guadeloupe par l'analyse des peuplements de macroinvertébrés benthiques et le calcul de l'Indice Biologique Macroinvertébrés des Antilles (IBMA), indice biologique spécifiquement conçu pour la Martinique et la Guadeloupe. Trois stations sont en bon état, cinq stations sont en état moyen, puis sept en état médiocre, enfin quatre en mauvais état.

- **MOTS CLES (THEMATIQUE ET GEOGRAPHIQUE)**

DIRECTIVE CADRE SUR L'EAU (DCE), COURS D'EAU, MASSES D'EAU, RESEAUX DE MESURE GUADELOUPE, INDICE BIOLOGIQUE, BIO-INDICATEUR, INVERTEBRES AQUATIQUE, INDICE BIOLOGIQUE MACROINVERTEBRES DES ANTILLES (IBMA)

- **ACHIEVEMENT OF BIOLOGICAL MONITORING BENTHIC MACROINVERTEBRATES IN RIVERS OF GUADELOUPE, DELPHINE BOUVIER & NICOLAS BARGIER**

- **ABSTRACT**

This study concerns the monitoring of the benthic macroinvertebrate biological element in rivers of Guadeloupe in the context of the implementation of the Water Framework Directive (WFD) in 2020. The twenty analyzed stations belong to the Monitoring Network (RCS). Twelve of them belong also to the Operational Control Network (RCO). Three stations belong both to the RCO and the complementary network and two belong to the complementary Network. The station Rivière Plessis – Vanibel (07046295) couldn't be sampled. The analyses of these 19 stations allow to establish the environmental status of water bodies of Guadeloupe. The water quality assessment was performed by the benthic macroinvertebrate identification and the calculation of the Antillean Benthic Macroinvertebrates Index (IBMA), which was specifically designed for Martinique and Guadeloupe. Three stations are in a good environmental status. There are also five stations in a medium environmental status, seven in a poor environmental status, then four stations are in a bad environmental status.

- **KEY WORDS (THEMATIC AND GEOGRAPHICAL AREA)**

WATER FRAMEWORK DIRECTIVE (WFD), STREAMS, WATER BODIES, GUADELOUPE MEASUREMENT NETWORK, BIOLOGICAL INDEX, BIOINDICATOR, AQUATIC INVERTEBRATES, ANTILLEAN MACROINVERTEBRATE BIOTIC INDEX (IBMA)

- **REALISATION DU SUIVI BIOLOGIQUE DCE DES MACROINVERTEBRES BENTHIQUES DANS LES COURS D'EAU DE GUADELOUPE, DELPHINE BOUVIER & NICOLAS BARGIER**

- **SYNTHESE POUR L'ACTION OPERATIONNELLE**

Dans le cadre de la mise en œuvre de la Directive Cadre européenne sur l'Eau (DCE), un programme de surveillance a été établi pour suivre l'état écologique et l'état chimique des milieux aquatiques de Guadeloupe, identifier les causes de dégradation de ces milieux et orienter les actions mises en œuvre pour atteindre le bon état. Ce programme repose sur la réalisation de prélèvements et d'analyses sur des supports différents (eau, sédiment, biote).

La présente étude a pour objet le suivi des macroinvertébrés benthiques des cours d'eau de Guadeloupe, ces organismes aquatiques étant l'un des maillons biologiques-clés identifiés par l'Union Européenne pour diagnostiquer l'État Écologique des cours d'eau dans tous les États-Membres.

La mise en œuvre de la DCE nécessite la mise en application d'indices biologiques permettant d'évaluer l'état écologique intégré des milieux aquatiques. Cependant, jusqu'à un passé récent, il ne pré-existait pas d'outils biologiques adaptés aux Antilles, les indices biologiques mis en place pour l'espace européen continental, dont la France métropolitaine, étant entachés d'un décalage biogéographique beaucoup trop important pour y être utilisables et donner des résultats satisfaisants.

Deux programmes de recherches faisant intervenir le groupement ASCONIT Consultants / Laboratoire Ecolab UMR5245, CNRS / HYDRECO GUYANE / Université Paul Sabatier Toulouse III ont vu le jour pour développer un indice de bioindication adapté au contexte des Antilles françaises (Martinique et Guadeloupe) et répondant aux exigences de la Directive Cadre européenne sur l'Eau (DCE) pour l'évaluation de la qualité biologique des cours d'eau.

Ces deux programmes de recherche (2010-2013) ont permis de mieux appréhender l'écologie des espèces d'invertébrés et les caractéristiques des milieux gouvernant leurs distributions, jusqu'à aboutir à la conception de l'Indice Biologique Macroinvertébrés des Antilles (IBMA).

L'IBMA est actuellement utilisé pour les différents types de réseaux de mesures mis en œuvre en Guadeloupe :

- **Le Réseau de Contrôle de Surveillance (RCS) de 20 stations :**

Ce réseau, à vocation pérenne, a pour objet principal de disposer d'un suivi des milieux aquatiques sur le long terme et de donner une image de l'état général des masses d'eau du district, en lien avec les objectifs d'atteinte du bon état établis par la DCE.

- **Le Réseau de Contrôle Opérationnel (RCO) de 12 stations :**

Ce réseau, à vocation ponctuelle, est réalisé pour les masses d'eau en risque de non atteinte du bon état, jusqu'à atteinte des objectifs d'état. Il peut être ciblé sur les paramètres déclassants uniquement. Les stations identifiées pour le contrôle opérationnel appartiennent toutes au réseau de surveillance.

- **Le Réseau Complémentaire de 5 stations :**

Ce réseau a été conçu pour suivre l'impact des micropolluants et acquérir des connaissances.

Les résultats ci-après concernent le suivi des réseaux DCE 2020 :

3 stations sont en bon état écologique :

- 07023495 - Rivière aux Herbes - Choisy
- 07028110 - Rivière Moustique Petit-Bourg – Trianon
- 07048110 - Rivière du Premier Bras - Amont Séverin

5 stations sont en état moyen écologique :

- 07012120 - Rivière Bras David - Site INRA
- 07012220 - Rivière Bras David - Maison de la forêt
- 07022008 - Rivière Grande Plaine - Pont RN
- 07026037 - Rivière La Lézarde - Diane
- 07044250 - Grande Rivière de Vieux Habitants - Prise d'eau


7 stations sont en état médiocre écologique :

- 07008015 - Grande Rivière de Capesterre - Pont RN
- 07009010 - Rivière du Grand Carbet - Pont RN

- 07016001 - Rivière Galion - Pont embouchure
- 07017650 - Rivière Grande Anse – Moscou
- 07021016 - Grande Rivière à Goyave - Amont SIS
- 07032002 - Rivière des Pères - Amont embouchure
- 07047007 - Rivière Nogent - Pont RN

4 stations sont en état mauvais écologique :

- 07028015 - Rivière Moustique Petit-Bourg - Amont pont RN1
- 07044007 - Grande Rivière de Vieux Habitants - Amont embouchure
- 07049040 - Rivière Bras de Sable - Ravine Chaude
- 07050012 - Rivière La Rose - Jardin d'Eau



L'année 2020 a été une année particulière en termes de prélèvements. En effet, en raison de la crise sanitaire liée à la pandémie de COVID-19, les échantillonnages ont eu lieu de mi à fin mai 2020, alors qu'un fort étage caractérisait l'hydrologie de cours d'eau. Cet écoulement très réduit, voire nul comme pour la station Rivière Plessis – Vanibel (07046295) non échantillonnée, ont eu un impact certain sur les notes indicielles. Le bilan proposé par l'IBMA est bien plus dégradé que l'année précédente. En effet, aucune station n'atteint le très bon état et seules trois stations sont dans un état au moins bon. Les richesses taxonomiques et les abondances semblent, quant à elles, peu impactées par les conditions de prélèvements. Enfin, les conclusions à tirer de l'étude des différents paramètres sont à considérer avec précaution tant il est difficile de distinguer l'impact de l'hydrologie lors de prélèvement des réels impacts ou des réelles conditions plus favorables propre aux stations.

Référence :

delphine.bouvier@hydrecolab.com

<http://www.hydrecolab.com>

SOMMAIRE

Article I.	Contexte et objectif de l'étude	7
Article II.	Description des interventions.....	7
Section II.1	Descripteurs : les invertébrés aquatiques.....	7
(a)	L'objectif.....	7
(b)	Les éléments à produire.....	7
Section II.2	Protocoles	7
(a)	Prélèvement des invertébrés aquatiques	8
(b)	Opérations de laboratoire : pré-traitement des échantillons.....	9
(c)	Tri et Détermination.....	9
(d)	Calcul de l'I.B.M.A.....	10
Article III.	Présentation générale des sites du réseau DCE.....	16
Article IV.	Campagne de prélèvement du réseau DCE 2020.....	17
Article V.	Analyse des peuplements de macroinvertébrés benthiques	18
Section V.1	Diversité et richesse spécifique.....	18
Section V.2	Indice Biologique des Macroinvertébrés des Antilles (IBMA)	18
Section V.3	Bilan comparatif de 2005 à 2020	23
Article VI.	Conclusion	28
Article VII.	Glossaire	29
Article VIII.	Sigles & Abréviations	31
Article IX.	Table des illustrations	32

Article I. Contexte et objectif de l'étude

Dans le cadre de la mise en œuvre de la Directive Cadre européenne sur l'Eau (DCE), un programme de surveillance a été établi pour suivre l'état écologique et l'état chimique des milieux aquatiques, identifier les causes de dégradation de ces milieux et orienter les actions mises en œuvre pour atteindre le bon état. Ce programme repose sur la réalisation de prélèvements et d'analyses sur des supports différents (eau, sédiment, biote).

La présente étude concerne le suivi biologique des invertébrés aquatiques en 2020 au niveau des sites des réseaux de surveillance, de contrôle opérationnel et de surveillance complémentaire.

Le présent document constitue le rapport de synthèse final 2020.

Article II. Description des interventions

Section II.1 Descripteurs : les invertébrés aquatiques

(a) L'objectif

Les macroinvertébrés aquatiques regroupent les insectes (larves, nymphes ou adultes), les crustacés, les mollusques, les vers et autres invertébrés, fixés sur un substrat ou non, dont une partie au moins du cycle de vie est aquatique retenus par un filet de 500µm de vide de maille. Cette grande hétérogénéité leur permet de couvrir un large spectre de réponses aux perturbations (Rosenberg et Resh, 1993). Ils sont progressivement devenus des outils majeurs de la biosurveillance des milieux aquatiques à travers le monde (Rosenberg et Resh, 1993 ; Chessman, 1999 ; Reynoldson *et al.*, 2006 ; Resh et Rosenberg, 2008 ; Wright *et al.*, 1998 (RIVPACS) ; Hering *et al.*, 2003 (AQEM Project) ; Furse *et al.*, 2006 (STAR Project)). Ils présentent des caractéristiques intéressantes pour la conception d'outils biologiques (Archaimbault, 2003) :

- une large répartition géographique (rendant les méthodes comparables à grande échelle) ;
- une durée de vie relativement longue (quelques mois à quelques années) ;
- une sédentarité au sein de leur habitat ;
- une grande diversité de forme due au grand nombre de taxa et de phyla appartiennent à ce groupe.

(b) Les éléments à produire

- Le compte rendu de la campagne de prélèvement 2020.
- Les inventaires de invertébrés aquatiques et l'analyse des peuplements.
- Le calcul de la richesse spécifique, de l'indice de Shannon et Weaver et de l'indice d'équitabilité.
- Le calcul des valeurs de l'Indice Biologique des Macroinvertébrés Benthiques et la détermination de l'état écologique des masses d'eau prospectées.
- Le bilan comparatif de 2009 à 2020.

Section II.2 Protocoles

Dans le cadre de la Directive Cadre Européenne sur l'Eau (DCE), des réseaux sont mis en place pour suivre l'impact des activités sur le milieu et connaître l'état de nos masses d'eau.

Deux programmes de recherches, faisant intervenir le groupement ASCONIT Consultants / Laboratoire Ecolab UMR5245, CNRS / HYDRECO GUYANE / Université Paul Sabatier Toulouse III, ont vu le jour pour développer un indice de bioindication adapté au contexte des Antilles françaises (Martinique et Guadeloupe) et répondant aux exigences de la Directive Cadre européenne sur l'Eau (DCE) pour l'évaluation de la qualité biologique des cours d'eau.

Ces deux programmes de recherche (2010-2013) ont permis de mieux appréhender l'écologie des espèces d'invertébrés et les caractéristiques des milieux gouvernant leurs distributions, jusqu'à aboutir à la conception de l'Indice Biologique Macroinvertébrés des Antilles (IBMA) et de l'ensemble des outils nécessaires à sa prise en main par les gestionnaires de l'eau : un atlas agrémenté d'une clé

de détermination taxonomique des macroinvertébrés benthiques, un guide méthodologique et l'outil de calcul de la note IBMA.

Comme l'IDA, l'IBMA est aujourd'hui l'outil réglementaire pour évaluer la qualité biologique des cours d'eau de Guadeloupe et de Martinique, comme en témoigne cet extrait de l'arrêté d'évaluation de 7 août 2015 :

Extrait de l'arrêté d'évaluation du 7 août 2015 concernant les invertébrés

1.1.4.2. Méthodes ou principes applicables en Guadeloupe et en Martinique
Guide méthodologique de mise en œuvre de l'indice biologique Macroinvertébrés Antilles (IBMA). A paraître en 2016. Dans l'attente de l'édition du guide méthodologique de mise en œuvre de l'IBMA, hormis en ce qui concerne l'identification des taxons, les référentiels méthodologiques et les spécificités de mise en œuvre sont : Méthode ou principes d'échantillonnage :
-Norme française : XP T90-333 (puis NF T90-333 dès son entrée en vigueur) : Qualité écologique des milieux aquatiques. Qualité de l'eau. Prélèvement des macro-invertébrés aquatiques en rivières peu profondes. 2009 ; -Protocole à adapter en fonction des spécificités de l'environnement étudié (H. Touron-Poncet, C. Bernadet, N. Bargier, R. Céréghino. Programme d'étude 2010-2013. Mise au point d'un indice de bioindication de la qualité de l'eau à partir des macroinvertébrés benthiques commun à la Guadeloupe et à la Martinique. Rapport final 2013-V1 (07-06-2013). Université Paul Sabatier Toulouse III/ Ecolab UMR5245, Asconit Consultants.
Méthode ou principes de traitement et d'analyse des échantillons :
-Norme XP T 90-388 (puis NF T90-388 dès son entrée en vigueur) : Qualité écologique des milieux aquatiques. Qualité de l'eau. Traitement au laboratoire d'échantillons contenant des macro-invertébrés de cours d'eau. 2010 ; -Protocole à adapter en fonction des spécificités des échantillons antillais (H. Touron-Poncet, C. Bernadet, N. Bargier, R. Céréghino. Programme d'étude 2010-2013. Mise au point d'un indice de bioindication de la qualité de l'eau à partir des macroinvertébrés benthiques commun à la Guadeloupe et à la Martinique. Rapport final 2013-V1 (07-06-2013). Université Paul Sabatier Toulouse III/ Ecolab UMR5245, Asconit Consultants.

(a) Prélèvement des invertébrés aquatiques

Les échantillons sont prélevés suivant la norme NF T90-333 de septembre 2016 intitulée « Qualité de l'eau – Prélèvement des macro-invertébrés aquatiques en rivières peu profondes » (Norme AFNOR, 39p).

Le principe de l'échantillonnage consiste à prélever la macrofaune benthique dont les dimensions sont supérieures à 500 µm dans différents types d'habitats du cours d'eau, définis de manière générale par la nature du support, la vitesse d'écoulement et la hauteur d'eau. Ce protocole prend en considération les habitats dominants et les habitats marginaux.

12 couples "substrat-vitesse" sont échantillonnés sur un tronçon dont la longueur sera déterminée suite à la phase préliminaire de repérage décrite ci-dessus. Le prélèvement sera effectué à l'aide d'un filet de type "Surber" (photos ci-dessus) ou au "Haveneau" (lorsque la hauteur d'eau le nécessite). Au niveau de chacun des 12 points, 1/20ème de m² est ainsi échantillonné.

L'ensemble des prélèvements sera réalisé en fonction du type de substrat conformément au protocole de la norme.

Après repérage des substrats dominants et marginaux et leur superficie relative, les 12 prélèvements seront réalisés en 3 groupes de 4 relevés suivant 3 phases d'échantillonnage :

- Phase A : 4 supports marginaux représentatifs par ordre d'habitabilité décroissante (bocal A),
- Phase B : 4 supports dominants par ordre d'habitabilité décroissante (bocal B),
- Phase C : 4 supports dominants par ordre de représentativité surfacique si plus de quatre substrats dominants ont été identifiés. Lorsque tous les substrats dominants ont été identifiés une fois, les prélèvements restant à effectuer sur les substrats sont positionnés au prorata de leur superficie relative totale. Il est retiré 10% au pourcentage total de recouvrement du substrat pour chaque prélèvement effectué (au cours de la phase 2 et 3), le plus fort reste des surfaces étant alors considéré pour effectuer le ou les prélèvements restant (bocal C).

Ces prélèvements seront répartis sur l'ensemble de la station. La technique de prélèvement (frotter, peigner, couper, etc.) et les volumes à prélever (et à ramener = refus) précisés dans la norme seront respectés.

Remarque :

Les prélèvements sont généralement regroupés par phase sur le terrain. Il peut toutefois arriver que certains prélèvements élémentaires soient conditionnés séparément si cela facilite le tri au laboratoire. Dans ce cas, le regroupement a lieu a posteriori.

Le matériel de prélèvement (filet surber, filet conique, tamis, récipient) sera soigneusement nettoyé entre chaque prélèvement élémentaire (et entre chaque station).

Un premier traitement des échantillons (élimination des éléments minéraux et organiques grossiers, remise à l'eau d'organismes d'espèces rares après identification (on précisera si elles figurent sur liste rouge), isolement de certains taxons fragiles dans des piluliers identifiés) sera effectué sur le terrain. Les prélèvements seront immédiatement fixés par addition de formol tamponné (solution 4%) ou d'éthanol (pour certains échantillons qui seront rapidement analysés) en attendant leur traitement, afin d'éviter tout phénomène de décomposition et/ou de préddation. Concernant les éventuels taxons rares relâchés, on reporte sur la fiche terrain le point de prélèvements dans lequel il a été capturé et le nom

du taxon (ainsi que le nombre) est reporté sur l'étiquette de la phase correspondante afin de ne pas oublier de l'ajouter à la liste faunistique finale.

Des étiquettes autocollantes, imprimées avant le départ sur le terrain, sont complétées sur le site et collées sur les flacons. Sur ces étiquettes figurent les indications suivantes :

- Le numéro d'étude,
- Le numéro identifiant interne unique de la station,
- Le nom du cours d'eau,
- Le nom de la station,
- Le numéro national de la station à 8 chiffres (s'il existe),
- L'échantillon contenu dans le flacon (phase ou prélèvement élémentaire),
- La date et l'heure de prélèvement,
- L'acronyme du préleur,
- Le conservateur utilisé
- La norme mise en œuvre.

On procédera donc au niveau de chaque station :

- A un remplissage des feuilles de terrain IRSTEA (Annexe V du CCTP),
- A la description du site,
- Au prélèvement de la macrofaune selon la norme NF T90-333,
- A la réalisation d'un schéma de la station, avec figuration des substrats présents et des vitesses d'écoulement,
- A la prise de photographies représentatives de la zone échantillonnée.

L'échantillonnage sera effectué dans des conditions hydrauliques stables.

Les flacons sont ensuite acheminés au laboratoire d'analyse d'HYDRECO GUYANE.

(b) Opérations de laboratoire : pré-traitement des échantillons

Le protocole appliqué est le suivant :

- Rinçage des tamis afin d'éviter la contamination entre échantillons ;
- Récupération du fixateur en vidant l'échantillon sur un tamis de 500 µm. Si le fixateur est du formol, il est transvasé dans la bonbonne de stockage « formol », si le fixateur est à base d'alcool, il est transféré dans la bonbonne de stockage « alcool » avant collecte pour traitement par une entreprise spécialisée.

Ces opérations sont effectuées sous hotte aspirante :

- Rinçage de l'échantillon abondamment à l'eau, sous la hotte aspirante ;
- Dans le cas d'un échantillon minéral, élutriation de l'échantillon, afin d'obtenir une fraction minérale et une fraction organique et ainsi faciliter le tri ;
- Dans le cas où l'échantillon est constitué de substrats de différentes granulométries, celui-ci est passé à travers une colonne de tamis (2 ou 3 tamis, selon le cas). L'obtention de deux fractions s'avère être, en général, un bon compromis entre facilité de tri et temps de tri ;
- Une fois rincé, l'échantillon est transvasé dans un ou plusieurs (si plusieurs fractions) récipient(s) adéquat(s) ;
- Rinçage du ou des tamis, afin d'éviter de contaminer l'échantillon suivant ;
- Rinçage soigneux du pot qui est mis à sécher avant de le ranger dans un carton, pour une utilisation ultérieure (ou renvoyé au client lorsque celui-ci a réalisé les prélèvements).

(c) Tri et Détermination

L'identification des taxons présents dans les échantillons sera effectuée sous loupe binoculaire, selon les niveaux taxonomiques détaillés dans le Guide Onema (Guide méthodologique pour la mise en œuvre de l'Indice Biologique Macroinvertébrés des Antilles – IBMA. Rapport ASCONIT Consultants (Bernadet C.), Laboratoire Ecolab CNRS-UMR5245, Onema).

Le comptage et la détermination des organismes concernent les formes larvaires, nymphales (dans la mesure du possible, en effet peu de clés de détermination sont disponibles à ce jour) et adultes. Les fourreaux vides, coquilles vides, les statoblastes de Bryozoaires et les gemmules de Spongiaires ne sont pas pris en compte.

Les individus sont déterminés généralement au niveau du genre ou de l'espèce, excepté pour les diptères et oligochètes qui sont déterminés à un niveau taxonomique supérieur comme la famille, l'ordre ou la tribu pour les Chironominae. Exceptionnellement, le niveau peut être moins précis pour des individus trop jeunes ou abimés qui ne peuvent être déterminés avec certitude au niveau de détermination requis. Dans ce cas, l'explication figure en commentaire de la liste faunistique.

Les taxons sont déterminés à l'aide des ouvrages de référence pour la détermination des taxons de Martinique et Guadeloupe cités dans le Guide Onema. La principale référence est la suivante :

Bernadet C., Touron-Poncet H., Bargier N. et Cereghino R., 2014. Atlas des macroinvertébrés benthiques des cours d'eau de Martinique et Guadeloupe. Directions de l'Environnement de l'Aménagement et du Logement (DEALs) et Offices De l'Eau (ODEs) de Martinique et de Guadeloupe. 184 p.

Tous les taxons présents dans l'échantillon sont déterminés, y compris ceux qui ne sont pas pris en compte dans le calcul de la note IBMA.

Si un ou plusieurs taxons est présents en trop grande quantité, un sous-échantillonnage peut être réalisé pour ces taxons : ces taxons sont dénombrés de manière exhaustive dans la moitié ou le quart de l'échantillon, puis leur nombre multiplié par 2 ou 4 pour obtenir une estimation de leur abondance dans l'échantillon global. Les autres taxons, présents en quantité raisonnables, sont dénombrés de manière exhaustive, sur la totalité de l'échantillon. Ainsi, la totalité de l'échantillon est analysé sous loupe binoculaire.


(d) Calcul de l'I.B.M.A.

A partir des listes faunistiques produites (abondance par taxon pour tous les taxons présents dans l'échantillon, l'indice multimétrique IBMA (Indice Biologique Macroinvertébrés des Antilles) sera calculé. Les indicateurs généraux (richesse taxonomique (=nombre total d'espèces) et d'abondance totale (nombre total d'individus) seront fournis en complément.

Les notes brutes IBMA seront calculées à partir des listes faunistiques. Les classes de qualité écologiques établies pour l'IBMA seront appliquées pour visualiser l'état écologique des stations.

Rappelons que l'IBMA est un indice généraliste qui répond au plus grand nombre de perturbations mais qui, pour l'heure, n'est pas capable d'identifier la nature des perturbations (pollution organique, pesticides, etc.).

Le calcul de l'IBMA est décrit ci-après.



Calcul des métriques

L'Indice Biologique Macroinvertébrés des Antilles (IBMA) est un indice multimétrique¹ qui considère sept métriques² :

- La richesse relative en taxons Ephéméroptères + Trichoptères + Coléoptères (ETC) dans les phases A+B, calculée comme suit :

$$X = (\text{Richesse (ETC)}_{A+B} / \text{Richesse totale}_{A+B}) \times 100$$

- La richesse relative en Trichoptères (T) dans les phases B+C :

$$X = (\text{Richesse (T)}_{B+C} / \text{Richesse totale}_{B+C}) \times 100$$

- L'abondance relative en Ephéméroptères dans les phases B+C ;

$$X = (\text{Abondance (E)}_{B+C} / \text{Abondance totale}_{B+C}) \times 100$$

¹ Indice multimétrique : combinaison de métriques qui, ensemble, sont présumées représenter une gamme de réponses des communautés biologiques aux perturbations d'origines anthropiques (AFNOR, 2009).

² Métrique : mesure calculée qui décrit certains aspects d'une communauté biologique tels que sa structure, son fonctionnement, ou toute autre caractéristique biologique. Par exemple, la richesse taxonomique ou le taux d'espèces détritivores (AFNOR, 2009).

- La richesse taxonomique totale des phases B+C (nombre de taxons total des phases B+C) ;
- L'indice de Shannon calculé sur les phases B+C, calculé comme suit :

$$H' = - \sum_{i=1}^S \left(\frac{n_i}{N} \right) \ln \left(\frac{n_i}{N} \right)$$

avec : S = le nombre total d'espèces, n_i = nombre d'individus d'une espèce dans l'échantillon, N = le nombre total d'individus toutes espèces confondues.

- Le trait relatif au préférendum d'habitat des substrats minéraux grossiers « Blocs Dalles Pierres Galets » : la préférence pour les « blocs » (plus gros substrats minéraux) diminue avec l'impact anthropique.

Remarque :

Les macroinvertébrés vivant préférentiellement sur ces substrats minéraux grossiers sont des taxons rhéophiles qui sont généralement polluosensibles.

- Le trait relatif au préférendum d'habitat pour la vase : la préférence pour la vase augmente avec la détérioration du milieu.

Remarque :

Les organismes vivant dans la vase (e.g. Chironomidae, Syrphidae) présentent des adaptations pour survivre dans des environnements faiblement oxygénés (hémoglobine, siphon respiratoire) qui leur confère une résistance à la pollution. Le paragraphe 7.2 est dédié au calcul de ce type de métrique.

Le calcul de ces deux dernières métriques relatives à des traits bio-écologiques des taxons est plutôt complexe. Il n'est alors pas détaillé ici, mais est détaillé dans le « Guide Onema pour la mise en œuvre de l'IBMA » (en cours de finalisation).

A, B et C correspondant aux différentes phases du protocole de prélèvement normalisé XP T 90-333 (septembre 2009).

Ces sept métriques doivent être calculées pour chaque site dont la qualité écologique est à évaluer à partir de l'inventaire faunistique établi pour le site, en prenant garde à considérer les phases du prélèvement demandées (A, B, C).

Toutes ces métriques sont initialement (avant normalisation) de TYPE II (décroissantes avec les impacts anthropiques), excepté la métrique relative au préferendum d'habitat pour la vase qui est une variable de type III (croissante)³.

Chacune des sept métriques composites est caractérisée par un coefficient qui reflète son efficacité à discriminer les sites soumis à des impacts anthropiques des sites de référence⁴. Les valeurs de ces coefficients, notés DE (Efficacité de Discrimination⁵), sont données dans le guide ONEMA. Ils entreront en compte dans le calcul de l'indice.

Ces sept métriques sont les plus stables en conditions de référence et les plus discriminantes des 411 métriques qui ont été testées pour construire l'indice.

Biotypologie

L'IBMA est un indice DCE-compatible qui mesure l'écart d'une communauté à sa référence. Six sous-écorégions (ou sous-ensembles biotypologiques) ont été mises en évidence en Guadeloupe (appelées « G1 », « G2 » et « G3 ») et en Martinique (« M4 », « M5 » et « M6 ») à partir des communautés de macroinvertébrés benthiques (Bernadet et al., 2013 ; Touron-Poncet et al., 2013). Il s'agit des régions :

- G1 pour le sous-ensemble regroupant des sites localisés dans la partie Centre Nord-Est de la Basse-Terre en Guadeloupe. Les sites sont proches géographiquement mais très distants au niveau de la qualité de l'eau. Les stations impactées montrent de très fortes dégradations (plus forte concentration en azote Kjeldahl) dans un environnement urbain ou agricole, tandis que les stations de références sont en zone de forêt ;
- G2 pour le sous-ensemble regroupant des stations situées dans la partie Ouest de la Basse-Terre en Guadeloupe. Une légère influence agricole se retrouve dans les sites de référence, pour la plupart en zone de forêt. Les stations impactées sont réparties dans des

³ Les métriques de TYPE I sont les métriques qui ne répondent pas en situation de perturbation(s) anthropique(s).

⁴ Etat de référence : l'état de référence d'un milieu aquatique est l'état dans lequel il serait dans des conditions naturelles ou proches du naturel, c'est à dire non impactées par les activités anthropiques. Cette notion est très différente de celle de biodiversité, puisqu'un milieu peut, par exemple, être naturellement pauvre, ou chargé en matières organiques et en azote, ou pauvre en oxygène. Cette référence est donc obligatoirement rapportée au type de milieu considéré (typologie).


⁵ DE : Efficacité de Discrimination. Reflète le pouvoir de discrimination d'une métrique pour un type de pression donné (Ofenböck et al., 2004).

- environnements urbain, agricole et/ou forestier. Du point de vue de l'impact anthropique, cette sous-région représente un intermédiaire entre les sous-régions G1 et G3 ;
- G3 pour le sous-ensemble regroupant des stations situées dans la partie Sud de la Basse-Terre en Guadeloupe. Les stations présentent des caractéristiques propres à un milieu volcanique avec une forte minéralisation de l'eau. Les stations impactées sont réparties dans les trois environnements (urbain, agricole et forestier) ;
 - M4 pour le sous-ensemble regroupant les stations situées en altitude et dans la partie Nord de la Martinique. L'écoulement de l'eau est torrentiel, et les substrats grossiers (blocs, dalles). Les stations sont dans un environnement forestier, préservé de l'urbanisation et des activités agricoles ;
 - M5 pour le sous-ensemble regroupant les stations situées en moyenne et en basse altitudes dans la partie Nord de la Martinique. L'écoulement de l'eau y est relativement turbulent, et les substrats restent assez grossiers (blocs, dalles). Les stations sont impactées par l'urbanisation et/ou les activités agricoles, de manière plus ou moins forte (concentration en ammonium élevée).
 - M6 pour le sous-ensemble regroupant les stations situées dans la partie Sud de la Martinique. Les stations sont situées à basse altitude. L'écoulement y est lentique et la granulométrie plus fine (pierres-galets, graviers, sable). Les stations sont impactées par leur environnement agricole et/ou fortement urbanisé, ce qui engendre un taux de matières en suspension élevé sur la plupart des stations de ce sous-ensemble.

Chaque sous-écorégions dispose de ses sites de références (et valeurs de références) qui servent de point de comparaison pour calculer l'écart à la référence des sites étudiés.

Il faut donc affecter chaque site dont la qualité écologique est à déterminer à une sous-région biotypologique.

La typologie est détaillée davantage dans le guide Onema IBMA.



Biotypologies des sites de Guadeloupe ayant servi au développement de l'IBMA.

Valeurs de référence

La Guadeloupe et la Martinique disposent de six jeux de valeurs de référence, soit un par sous-région biotypologique. Ces valeurs ont été définies à partir de groupes de stations peu/pas impactées dites « de moindre impact » ou « LIRR » (Least Impaired River Reaches). Elles servent de point de comparaison pour évaluer la qualité écologique de chacun des sites à partir de ses références.

Autrement dit, on utilise comme point de comparaison le jeu de valeurs de références correspondant à la sous-région à laquelle appartient le site dont la qualité écologique est à évaluer.

Les valeurs de références (meilleure valeur et pire valeur) sont données pour chaque métrique composite de l'IBMA et sont propres à chacune des sous-régions biotypologiques.

Valeurs de référence (meilleures valeurs et pire valeur) pour la Guadeloupe (sous-écorégions G1 à G3) et la Martinique (sous-écorégions M4 à M6) et pour chacune des sept métriques composites de l'indice IBMA. Moyenne LIRR et écart-type LIRR : moyenne et écart-type des valeurs de la métrique en situation de référence, respectivement.

Sous-écorégion	Valeurs de références	Blocs Dalles Pierres Galets [A+B+C]	Vase [A+B+C]	Nombre de taxons ETC [A+B]	Nombre de taxons [B+C]	Indice de Shannon [B+C]	Nombre de taxons Trichoptera [B+C]	Abondance Ephemeroptera [B+C]
G1	Moyenne LIRR	23.4719	8.3919	47.4027	38.1429	2.8491	21.9336	16.4904
	Ecart-type LIRR	2.6728	1.6626	5.8086	5.2735	0.1755	2.9830	7.8073
	Meilleure valeur	1.3386	-1.2654	0.9271	1.2271	1.3029	0.8977	1.672
G2	Moyenne LIRR	28.2483	6.7348	48.1151	33.0000	2.6808	19.4743	35.6499
	Ecart-type LIRR	5.1205	1.9193	3.6119	4.6904	0.2654	4.0386	12.3618
	Meilleure valeur	1.5868	-1.2677	1.6194	1.3989	1.3274	1.3035	1.1347
G3	Moyenne LIRR	27.5661	6.8864	42.8530	22.0000	2.5182	17.6781	27.1686
	Ecart-type LIRR	8.3005	3.4153	5.5470	4.7434	0.2174	3.9517	15.5411
	Meilleure valeur	1.3047	-1.1035	0.9279	0.8011	1.2041	1.2105	1.3228
M4	Moyenne LIRR	25.2346	5.5489	52.5738	26.3750	2.3930	18.4208	35.6716
	Ecart-type LIRR	3.9072	2.5743	3.1504	4.1382	0.3514	2.3552	19.8412
	Meilleure valeur	0.959	-1.4706	1.2739	0.2133	0.1633	0.1677	0.763
M5	Moyenne LIRR	41.5701	5.2122	53.0784	22.6000	2.0354	19.6444	23.9931
	Ecart-type LIRR	18.8061	3.0730	5.7958	9.0995	0.4521	3.3330	19.4121
	Meilleure valeur	1.1808	-1.0122	1.1367	1.2308	1.0935	1.163	1.1346
M6	Moyenne LIRR	18.9909	11.1020	48.3190	25.5000	2.2040	12.7267	37.8280
	Ecart-type LIRR	1.9464	1.5914	10.1323	4.2032	0.5543	3.0999	12.4509
	Meilleure valeur	1.123	-0.7536	1.1529	1.1301	1.1615	0.8042	1.0204
Toutes les sous-écorégions	Pire valeur	-3.1315	4.1702	-5.1889	-4.2128	-6.1363	-4.8361	-2.9984

Calcul des écarts normalisés à la situation de référence

Une fois que le site dont la qualité écologique est à évaluer a été affecté à une des six sous-régions biotypologiques des Antilles françaises, les valeurs des métriques peuvent être exprimées en EQRs grâce aux valeurs de références de la sous-région considérée.

En premier lieu, les valeurs des métriques sont transformées en écarts normalisés (SES) à la situation de référence pour le même type de cours d'eau de la façon suivante :

$$\text{SES} = (\text{Obs} - \text{Mtype}) / \text{sdtype} [1]$$

avec : Obs = valeur observée de la métrique pour une station donnée, et Mtype et sdtype = moyenne et écart-type des valeurs de la métrique en situation de référence pour le type de cours d'eau considéré (sous-région biotypologique de la station).

Se référer au tableau précédent pour les valeurs de référence Mtype et sdtype.

Grâce à cette normalisation, les valeurs des métriques pourront être comparées entre types de cours d'eau différents.

Les valeurs sont ensuite exprimées en Ratios de Qualité Ecologique (EQRs) de la façon suivante :

- Si la métrique est de TYPE I ou II : EQR = (SES - Mini)/(Maxi- Mini) [2]
- Si la métrique est de TYPE III : EQR = 1- (SES - Mini)/(Maxi- Mini) [3]

avec « SES » : la valeur de la métrique observée pour un point de prélèvement donné après normalisation en SES, sur un cours d'eau appartenant à un type déterminé.

Pour l'équation [2], « Maxi » et « Mini » correspondent respectivement à la « meilleure » et la « pire » valeur pour cette métrique sur le même type de cours d'eau, alors que dans l'équation [3] « Maxi » et « Mini » correspondent respectivement à la « pire » et la « meilleure » valeur de la métrique.

Se référer au tableau précédent pour les valeurs de référence « meilleure valeur » et « pire valeur ».

Si la valeur observée est supérieure à la meilleure valeur (cas d'une station de meilleure qualité comparé à la valeur de référence), alors la valeur de l'EQR est bornée à 1. De même, si la valeur de l'EQR est inférieure à la pire valeur, la valeur de l'EQR est bornée à 0 (la qualité est plus faible que la pire des valeurs).

Calcul de la note IBMA

La formule pour calculer l'indice IBMA est donnée dans l'équation suivante :

$$\text{IBMA} = \frac{\sum (\text{DEm} \times \text{EQRm})}{\sum \text{DEm}} \quad [4]$$

avec DEm l'efficacité de discrimination de la métrique « m » et EQRm la valeur d'EQR de la métrique « m ».

Le score final de l'indice est compris entre 0 et 1, une note proche de 1 reflétant un très bon état écologique et une valeur proche de 0 un mauvais état écologique.

Dans ce calcul, les valeurs d'EQR pour une métrique sont multipliées par l'efficacité de discrimination de la métrique, ce qui permet de donner plus de poids aux métriques qui ont un plus fort DE. La division par la somme des DE des 7 métriques permet de borner les valeurs de l'indice entre zéro et 1.

Les classes de qualité écologique

L'indice est interprété en termes de 5 classes de qualité écologique (« Très Bon », « Bon », « Moyen », « Médiocre » et « Mauvais »).

Deux grilles de classes de d'état sont utilisées, une première pour les sous-écorégions « G1, G2, G3, M4 et M5 », et une seconde propre à la sous-écorégion « M6 ».

Limites des classes d'états de l'indice IBMA pour les sous-écorégions G1, G2, G3, M4 et M5.

Etat mauvais	Etat médiocre	Etat moyen	Bon état	Très bon état
[0 ; 0.3537 [[0.3537 ; 0.4866 [[0.4866 ; 0.6003 [[0.6003 ; 0.7324 [[0.7324 ; 1]

Limites des classes d'états de l'indice IBMA pour la sous-écorégion M6.

Etat mauvais	Etat médiocre	Etat moyen	Bon état	Très bon état
[0 ; 0.2900 [[0.2900 ; 0.3500 [[0.3500 ; 0.5000 [[0.5000 ; 0.7324 [[0.7324 ; 1]

Les classes de qualité écologique

La DCE-conformité de l'IBMA a été validée par l'Onema (Office National de l'Eau et des Milieux Aquatiques) sur le plan technique. L'indice étant encore « jeune », il conviendra de ré-éprouver sa robustesse après quelques années de fonctionnement et d'envisager des améliorations (ex. grâce à l'apport de nouvelles données), le cas échéant.

Par conséquent, il est recommandé d'utiliser la méthode avec un niveau d'incertitude « moyen » pour les sous-écorégions G1, G2, G3 M4 et M5.

La robustesse de l'indice est plus faible pour la sous-écorégion M6 de Martinique en raison de l'absence de conditions de référence naturelles (celles-ci ont été extrapolées d'autres types), ce qui conduirait à une sous-évaluation de la qualité des rivières. Pour cette sous-écorégion M6, il est recommandé d'utiliser la méthode avec un niveau d'incertitude « fort » et d'avoir recours à une expertise.

Notre expérience dans le domaine de la bioindication, notre connaissance du milieu et de l'indice IBMA que nous avons conçue nous permettront d'apporter notre avis d'expert en complément de la note IBMA et de la classe de qualité écologique, pour en affiner l'interprétation.

Niveaux d'incertitudes

La DCE-conformité de l'IBMA a été validée par l'Onema (Office National de l'Eau et des Milieux Aquatiques) sur le plan technique. L'indice étant encore « jeune », il conviendra de ré-éprouver sa robustesse après quelques années de fonctionnement et d'envisager des améliorations (ex. grâce à l'apport de nouvelles données), le cas échéant.

Par conséquent, il est recommandé d'utiliser la méthode avec un niveau d'incertitude « moyen » pour les sous-écorégions G1, G2, G3 M4 et M5.

Notre expérience dans le domaine de la bioindication, notre connaissance du milieu et de l'indice IBMA que nous avons conçu nous permettront d'apporter notre avis d'expert en complément de la note IBMA et de la classe de qualité écologique, pour en affiner l'interprétation.

Article III. Présentation générale des sites du réseau DCE

En 2020, 20 stations du Réseau de Contrôle de Surveillance (RCS) ainsi que 13 stations du Réseau de Contrôle Opérationnel (RCO) et 5 stations du Réseau complémentaire du district de la Guadeloupe font l'objet d'un suivi biologique. Les prélèvements ont eu lieu du mercredi 13 mai au lundi 29 juin 2020. La station Rivière Plessis – Vanibel (07046295) n'a pu être échantillonnée à cause de l'absence d'eau au point théorique de prélèvement.

Tableau 1 : Coordonnées géodésiques des stations du réseau de suivi DCE Guadeloupe 2020 (correspondance des codes internes avec les codes SANDRE)

Masse d'eau	Code Sandre	Entité hydrographique	Station/Localisation	Commune	Réseaux	Coordonnées théorique (WGS84, UMT Nord fuseau 20)		Coordonnées relevées sur le terrain (WGS84, UMT Nord fuseau 20)		Pressions anthropiques potentielles connues	
						X	Y	X	Y		
FRIR16	07008015	Grande Rivière de Capesterre aval	Pont RN	Capesterre-BE	RCS/complémentaire	653277	1775898	653164	1776025	Agriculture	Habitations
FRIR18	07009010	Rivière du Grand Carbet	Pont RN	Capesterre-BE	RCS/RCO/complémentaire	652309	1772019	652266	1772079	Agriculture	Habitations
FRIR02	07012120	Rivière Bras David aval	Site INRA	Petit-Bourg	RCS/RCO	642513	1791236	642406	1791188		
FRIR41	07012220	Bassin amont Grande Rivière à Goyave Rivière	Maison de la forêt	Petit-Bourg	RCS/RCO	639670	1788752	639587	1788712	Baignade	
FRIR23	07016001	Rivière du Galion	Pont embouchure	Basse-Terre	RCS/RCO	636735	1767891	636753	1767891	Zone urbanisée en amont	Agriculture
FRIR45	07017650	Rivière Grande Anse	Moscou	Trois-Rivières	RCS/RCO	643549	1771098	643534	1771098	Agriculture	
FRIR05	07021016	Grande Rivière à Goyave aval 1	Amont SIS	Sainte-Rose	RCS/RCO	641948	1798980	641908	1799049	Agriculture	
FRIR32	07022008	Rivière Grande Plaine aval	Pont RN	Pointe-Noire	RCS/RCO	630809	1792388	630855	1792385		
FRIR24	07023495	Rivière aux Herbes	Choisy	Sainte-Claude	RCS	640222	1771815	-	-	Pâturage - Maraichage	Zone urbanisée
FRIR08	07026037	Rivière La Lézarde aval	Diane	Petit-Bourg	RCS/RCO	645541	1790069	645559	1790151	Pâturage	Habitations
FRIR10	07028005	Rivière Moustique Petit-Bourg aval	Amont pont RN1	Petit-Bourg	RCS/RCO/complémentaire	649406	1789513	649396	1789470	Agriculture	Habitations
FRIR09	07028110	Rivière Moustique Petit-Bourg amont	Trianon	Petit-Bourg	RCS/RCO	646772	1787283	646774	1787243		
FRIR25	07032002	Rivière des Pères	Amont embouchure	Baillif	RCS/RCO/complémentaire	634389	1770505	634476	1770519	Zone urbanisée	Agriculture
FRIR28	07044007	Grande Rivière de Vieux Habitants aval	Amont embouchure	Vieux-Habitants	RCS/complémentaire	632630	1775915	631938	1776054	Zone urbanisée en amont	
FRIR27	07044250	Bassin amont des Rivières de Vieux Habitants et Beaugendre	Prise d'eau	Vieux-Habitants	RCS	636348	1778951	636424	1778971		
FRIR26	07046295	Rivière Plessis	Vanibel	Vieux-Habitants	RCS/RCO	635600	1775080	Non échantillonnée		Habitations	
FRIR36	07047007	Rivière Nogent aval	Pont RN	Sainte-Rose	RCS/RCO	634618	1808426	634566	1808403	Agriculture	Zone urbanisée en amont
FRIR04	07048110	Rivière du Premier Bras aval	Amont Séverin	Sainte-Rose	RCS	638621	1799261	614209	161605	Habitations	
FRIR03	07049040	Rivière Bras de Sable aval	Ravine Chaude	Lamentin	RCS	642076	1794945	642045	1794941	Agriculture	Habitations
FRIR12	07050012	Rivière La Rose aval	Jardin d'Eau	Goyave	RCS	650420	1785943	-	-	Agriculture	

Article IV. Campagne de prélèvement du réseau DCE 2020

La campagne de prélèvement du réseau DCE 2020 a eu lieu du 13 mai au 29 juin 2020 (Tableau 2). Marion LABEILLE et Jules VILLENEUVE ont réalisé les prélèvements de macroinvertébrés benthiques.

Tableau 2 : Dates de prélèvement des stations de la DCE 2020

Code SANDRE	Entité hydrographique	Station / Localisation	Date de prélèvement	Code interne
07008015	Grande Rivière de Capesterre aval	Pont RN	14/05/2020	CAA
07009010	Rivière du Grand Carbet	Pont RN	14/05/2020	GCP
07012120	Rivière Bras David aval	Site INRA	25/06/2020	BDI
07012220	Bassin amont Grande Rivière à Goyave Rivière Bras David	Maison de la forêt	26/06/2020	BDM
07016001	Rivière du Galion	Pont embouchure	28/06/2020	GPA
07017650	Rivière Grande Anse	Moscou	14/05/2020	GAM
07021016	Grande Rivière à Goyaves aval 1	Amont SIS	29/06/2020	GGA
07022008	Rivière Grande Plaine aval	Pont RN	15/05/2020	GAP
07023495	Rivière aux Herbes	Choisy	28/06/2020	HEC
07026037	Rivière La Lézarde aval	Diane	13/05/2020	LED
07028015	Rivière Moustique Petit-Bourg aval	Amont pont RN1	13/05/2020	MPP
07028110	Rivière Moustique Petit-Bourg amont	Trianon	13/05/2020	MPT
07032002	Rivière des Pères	Amont embouchure	28/06/2020	PEE
07044007	Grande Rivière Vieux-Habitants aval	Amont embouchure	15/05/2020	VHE
07044250	Bassin amont des Rivières Vieux-habitants et de Beaugendre	Prise d'eau	26/06/2020	VHG
07046295	Rivière du Plessis	Vanibel	26/06/2020	PLV
07047007	Rivière Nogent aval	Pont RN	15/05/2020	NOA
07048110	Rivière du Premier Bras aval	Amont Séverin	29/06/2020	PBS
07049040	Rivière Bras de Sable aval	Ravine Chaude	29/06/2020	BSC
07050012	Rivière La Rose aval	Jardin d'eau	25/06/2020	ROJ

Un fichier informatique Excel regroupant tous les inventaires a été joint à ce document (annexe informatique).

Les codes internes présentés dans le Tableau 2 sont utilisés pour les présentations cartographiques de ce rapport pour un souci de lisibilité.

Article V. Analyse des peuplements de macroinvertébrés benthiques

Section V.1 Diversité et richesse spécifique

Le nombre d'individus échantillonnés par station varie entre les stations de façon très importante (entre 20 et 2094 individus) et le nombre de taxons inventoriés est également variable d'une station à l'autre, entre 11 et 36 taxons (Tableau 3).

Les valeurs de diversité (indice de Shannon & Weaver) se révèlent également variables, entre 0,50 (équitabilité = 0,15) au niveau de la station Rivière des Pères – Amont Embouchure (07032020) et 3,00 (équitabilité = 0,91) au niveau de la station Rivière Moustique Petit-Bourg amont - Trianon (07028110). Contrairement au premier indice, l'équitabilité permet de s'affranchir des variations du nombre de taxons et de mieux appréhender l'équilibre entre les espèces au sein du peuplement.

Tableau 3 : Richesse spécifique en indice de diversité des peuplements - campagne 2020

Code Sandre	Entité hydrographique	Station	Réseau	Effectif compté	Nb taxons	Diversité	Equitabilité
07008015	Grande Rivière de Capesterre aval	Pont RN	RCS	291	18	1,55	0,54
07009010	Rivière du Grand Carbet	Pont RN	RCS/RCO	259	14	0,83	0,31
07012120	Rivière Bras David aval	Site INRA	RCS/RCO	435	30	2,54	0,75
07012220	Bassin amont Grande Rivière à Goyave Rivière	Maison de la forêt	RCS/RCO	351	25	1,87	0,58
07016001	Rivière du Galion	Pont embouchure	RCS/RCO	465	21	1,09	0,36
07017650	Rivière Grande Anse	Moscou	RCS/RCO	20	11	2,16	0,90
07021016	Grande Rivière à Goyave aval 1	Amont SIS	RCS/RCO	853	24	1,98	0,62
07022008	Rivière Grande Plaine aval	Pont RN	RCS/RCO	1049	30	1,47	0,43
07023495	Rivière aux Herbes	Choisy	RCS	249	24	2,13	0,67
07026037	Rivière La Lézarde aval	Diane	RCS/RCO	494	34	2,18	0,62
07028005	Rivière Moustique Petit-Bourg aval	Amont pont RN1	RCS/RCO/compl.	606	25	1,52	0,47
07028110	Rivière Moustique Petit-Bourg amont	Trianon	RCS	145	27	3,00	0,91
07032002	Rivière des Pères	Amont embouchure	RCS/RCO/compl.	2094	26	0,50	0,15
07044007	Grande Rivière de Vieux Habitants aval	Amont embouchure	RCS/compl.	291	15	1,51	0,56
07044250	Bassin amont des Rivières de Vieux Habitants et Beaugendre	Prise d'eau	RCS	279	24	2,69	0,85
07046295	Rivière Plessis	Vanibel	RCS/RCO	-	-	-	-
07047007	Rivière Nogent aval	Pont RN	RCS/RCO	717	36	1,72	0,48
07048110	Rivière du Premier Bras aval	Amont Séverin	RCS	298	34	2,80	0,79
07049040	Rivière Bras de Sable aval	Ravine Chaude	RCS	1155	30	1,76	0,52
07050012	Rivière La Rose aval	Jardin d'Eau	RCS	147	23	2,54	0,81
			MIN.	20	11	0,50	0,15
			MOY.	537	25	1,88	0,60
			MAX.	2094	36	3,00	0,91

Source des données : Hydrico/Eco in'Eau/Office de l'eau Guadeloupe

Section V.2 Indice Biologique des Macroinvertébrés des Antilles (IBMA)

Les notes obtenues, ainsi que l'évaluation de la qualité biologique globale, sont consignées dans le Tableau 4 et illustrées dans la Figure 1.

Tableau 4 : Indice Biologique des Macroinvertébrés des Antilles (IBMA) - campagne 2020

SANDRE	Cours d'eau	Station	Bio-typo	Réseau	Note EQR	Classe d'état écologique
07008015	Grande Rivière de Capesterre	Pont RN	G1	RCS	0,4615	Etat médiocre
07009010	Rivière du Grand Carbet	Pont RN	G3	RCS/RCO	0,4357	Etat médiocre
07012120	Rivière Bras David	Site INRA	G1	RCS/RCO	0,5114	Etat moyen
07012220	Rivière Bras David	Maison de la forêt	G2	RCS/RCO	0,5446	Etat moyen
07016001	Rivière du Galion	Pont Embouchure	G3	RCS/RCO	0,4622	Etat médiocre
07017650	Rivière Grande Anse	Moscou	G3	RCS/RCO	0,4398	Etat médiocre
07021016	Grande Rivière à Goyave	Amont SIS	G1	RCS/RCO	0,4222	Etat médiocre
07022008	Rivière Grande Plaine	Pont RN	G3	RCS/RCO	0,4984	Etat moyen
07023495	Rivière aux Herbes	Choisy	G3	RCS	0,7238	Bon état
07026037	Rivière Lézarde	Diane	G1	RCS/RCO	0,5023	Etat moyen
07028005	Rivière Moustique	Amont Pont RN1	G1	RCS/RCO/complémentaire	0,2902	Etat mauvais
07028110	Rivière Moustique	Trianon	G2	RCS	0,6886	Bon état
07032002	Rivière des Pères	Amont Embouchure	G1	RCS/RCO/complémentaire	0,4270	Etat médiocre
07044007	Grande Rivière de Vieux Habitants	Amont Embouchure	G2	RCS/complémentaire	0,1926	Etat mauvais
07044250	Grande Rivière de Vieux Habitants	Prise d'eau	G2	RCS	0,5771	Etat moyen
07046295	Rivière du Plessis	Vanibel	G2	RCS/RCO	-	-
07047007	Rivière Nogent	Pont RN	G2	RCS/RCO	0,3974	Etat médiocre
07048110	Rivière du Premier Bras	Amont Séverin	G1	RCS	0,6510	Bon état
07049040	Rivière Bras de Sable	Ravine Chaude	G1	RCS	0,3036	Etat mauvais
07050012	Rivière La Rose	Jardin d'eau	G1	RCS	0,2735	Etat mauvais

En 2020, les stations se répartissent en cinq classes d'état (Figure 1) :

- 3 stations sont dans un état « au moins bon » (« bon ») :
 - o Bon état :

07023495 - Rivière aux Herbes - Choisy

07028110 - Rivière Moustique Petit-Bourg - Trianon

07048110 - Rivière du Premier Bras - Amont Séverin

- 15 stations sont dans un état « moins que bon » (« moyen », « médiocre » ou « mauvais ») :
 - o Etat moyen :

07012120 - Rivière Bras David - Site INRA

07012220 - Rivière Bras David - Maison de la forêt

07022008 - Rivière Grande Plaine - Pont RN

07026037 - Rivière La Lézarde - Diane

07044250 - Grande Rivière de Vieux Habitants - Prise d'eau

- o Etat médiocre :

07008015 - Grande Rivière de Capesterre - Pont RN

07009010 - Rivière du Grand Carbet - Pont RN

07016001 - Rivière du Galion – Port Embouchure

07017650 - Rivière Grande Anse – Moscou

07021016 - Grande Rivière à Goyave - Amont SIS

07032002 - Rivière des Pères - Amont embouchure

07047007 - Rivière Nogent - Pont RN

- o Etat mauvais

07028005 - Rivière Moustique Petit-Bourg - Amont pont RN1

07044007 - Grande Rivière de Vieux Habitants - Amont embouchure

07049040 - Rivière Bras de Sable - Ravine Chaude

07050012 - Rivière La Rose - Jardin d'Eau

Moins d'un cinquième des stations (16%) est donc qualifiée dans un état au moins bon, alors que la plupart (84%) est qualifiée dans un état inférieur à celui de bon.

Pour environ la moitié des stations, le calcul de l'IBMA n'a pas pu prendre en compte un pourcentage du peuplement :

- 07008015 – Grande Rivière de Capesterre – Pont RN : 11% du peuplement sont des Atyidae (SANDRE : 860) et *Palaemon* (SANDRE : 20410), non pris en compte sur le site SEEE ;
- 07009010 – Rivière du Grand Carbet – Pont RN : 14% du peuplement sont des Atyidae (SANDRE : 860) et *Palaemon* (SANDRE : 20410), non pris en compte sur le site SEEE ;
- 07016001 - Rivière du Galion – Pont Embouchure : 5% du peuplement sont des *Palaemon* (SANDRE : 20410), non pris en compte sur le site SEEE ;
- 07012120 - Rivière Bras David - Site INRA : 3% du peuplement sont des Leptoceridae (SANDRE : 310), non pris en compte sur le site SEEE ;

- 07021016 – Grande Rivière à Goyave – Amont SIS : 8% du peuplement sont des *Paraplea* sp. (SANDRE : 20446) et Anisoptera (SANDRE : 9787), non pris en compte sur le site SEEE ;
- 07022008 - Rivière Grande Plaine - Pont RN : 3% du peuplement sont des *Brachymetra* sp. (SANDRE : 20439), non pris en compte sur le site SEEE ;
- 07026037 - Rivière La Lézarde – Diane : 3% du peuplement sont des Atyidae (SANDRE : 860), non pris en compte sur le site SEEE ;
- 07032002 - Rivière des Pères - Amont embouchure : 4% du peuplement sont des Libellulidae (SANDRE : 696), non pris en compte sur le site SEEE ;
- 07044007 - Grande Rivière de Vieux Habitants - Amont embouchure : 7% du peuplement sont des *Palaemon*. (SANDRE : 20410), non pris en compte sur le site SEEE ;
- 07047007 - Rivière Nogent - Pont RN : 14% du peuplement sont des Leptoceridae (SANDRE : 310), *Brachymetra* sp. (SANDRE : 20439), Libellulidae (SANDRE : 696), Anisoptera (SANDRE : 9787) et Atyidae (SANDRE : 860), non pris en compte sur le site SEEE ;
- 07049040 - Rivière Bras de Sable – Ravine Chaude : 3% du peuplement sont des Anisoptera (SANDRE : 9787), non pris en compte sur le site SEEE ;




Figure 1 : Carte de qualité de l'état écologique du réseau DCE Guadeloupe en 2020
Source des données : Hydreco

Section V.3 Bilan comparatif de 2005 à 2020

Les richesses taxonomiques, abondances et états écologiques sont récapitulés depuis le début du suivi des stations du réseau DCE en 2005 (ou 2010) dans les Tableau 5, Tableau 6, Tableau 7.

Ces chroniques permettent de visualiser les éventuelles tendances évolutives de chaque station depuis 2005.

- Richesse taxonomique et abondance

L'année 2019 était marquée par une augmentation de la richesse taxonomique pour 90% des stations. En 2020, un peu plus de la moitié des stations ont une richesse taxonomique moindre par rapport à 2019. Cette diminution est d'au moins dix taxa pour certaines stations : Rivière Grande Anse – Moscou (07017650), Rivière Moustique – Amont Pont RN1 (07028005), Rivière du premier Bras – Amont Séverin (07048110) et Rivière Bras de Sable – Ravine Chaude (07048110). Pour ces stations, le nombre de taxa échantillonnés est généralement le plus faible obtenu depuis le début de suivi. A contrario, les stations Rivière Grande Plaine – Pont RN (07022008) et Rivière Lézarde - Diane (07026037) ont une richesse taxonomique bien plus importante : pour la première, c'est un nombre de taxa qui n'avait pas été atteint depuis 2012, pour la seconde ce nombre de taxa est cohérent avec les richesses observées avant 2018.

L'abondance en macroinvertébrés benthiques est une métrique qui varie pour toutes les stations, depuis le début du suivi. En 2020, pour la moitié des stations, ce paramètre est à la hausse. Cette hausse est importante, notamment Rivière du Galion – Pont Embouchure (07016001), Rivière Grande Plaine – Pont RN (07022008), Rivière des Pères – Amont Embouchure (07032002) et Rivière Bras de Sable (07049040). A l'inverse, une baisse majeure est observée pour les stations Rivière aux Herbes – Choisy (07023495), Rivière Moustique – Amont Pont RN1 (07028005) et Rivière du premier Bras – Amont Séverin (07048110)

- Notes IBMA

Comparaison des notes IBMA de 2020 avec celles de l'année 2019 :

- Trois stations conservent un état équivalent. En effet, les stations Rivière du Grand Carbet – Pont RN (7009010) et Rivière Nogent – Pont RN (07047007) persistent dans un état dégradé (état médiocre) ; A l'inverse, la station Rivière Moustique – Trianon (07028110) confirme l'amélioration observée en 2019.
- Trois stations voient leur état s'améliorer, avec notamment la station Rivière aux Herbes – Choisy (07023495) pour laquelle son état devient bon ;
- Treize stations sont, quant à elles, déclassées entre 2019 et 2020 et pour la majorité d'une seule classe d'état. Pour trois stations, cette évolution est importante (perte de trois ou quatre classes de qualité) alors qu'elles étaient associées à un bon état voire un très bon état précédemment : Rivière Grande Anse – Moscou (07017650), Rivière Bras de Sable – Ravine Chaude (07049040) et Rivière La Rose – Jardin d'eau (07050012). La cause de ces importantes dégradations est difficile à supposer au vu des conditions de prélèvements particulières cette année en fin de carême très sec.

Utilisation de la valeur moyenne des notes IBMA des deux dernières années du suivi : quatorze stations sont dans état « moins que bon » :

- Grande Rivière de Capesterre – Pont RN (07008015) : station en bon état jusqu'en 2014, son état continuait à se dégrader en 2018 (valeur d'indice la plus faible bien que la classe d'état reste la même). Son état s'est amélioré en 2019 mais il se dégrade à nouveau en 2020.
- Rivière du Grand Carbet – Pont RN (07009010) : après une amélioration de son état en 2017, l'état de cette station se dégrade à nouveau en 2018 et cela persiste jusqu'en 2020.
- Rivière Bras David – Maison de la forêt (07016001) : station majoritairement en bon, voire en très bon état depuis le début du suivi, son état moyen 2020 est à confirmer lors du prochain suivi.
- Rivière Galion - Pont embouchure (07016001) : la dégradation de l'état notée en 2018 continue en 2019, et s'accentue en 2020 en atteignant un état médiocre.
- Rivière Grande Anse – Moscou (07017650) : station principalement en très bon état depuis 2010, la dégradation à l'état médiocre est brutale.
- Grande Rivière à Goyave - Amont SIS (07021016) : la dégradation importante de l'état de cette station s'améliore légèrement en 2020. A surveiller.

- Rivière Grande Plaine – Pont RN (07022008) : station avec un état variable au cours du suivi, avec une légère amélioration en 2020.
- Rivière aux Herbes – Choisy (07023495) : station instable dont l'état s'est légèrement amélioré depuis 2014, et après une chute de l'état en 2018 et 2019, l'année 2020 est associée à un bon état comme en 2016.
- Rivière La Lézarde – Diane (07026037) : en très bon état de 2012 à 2017, puis en état moyen en 2018, l'année 2019 attribue un bon état à cette station. Cette amélioration ne s'est pas confirmée en 2020 avec un retour à un état moyen.
- Rivière Moustique - Amont pont RN1 (07028005) : la dégradation de cette station depuis 2018 persiste en 2020 en atteignant l'état mauvais. A surveiller.
- Rivière Moustique – Trianon (07028110) : le retour à un bon état en 2019, puis en 2020, semble confirmer la ponctualité de l'état médiocre défini en 2018.
- Rivière des Pères – Amont Embouchure (07032002) : station dont l'état varie depuis le début de suivi entre le bon état et l'état médiocre. En 2020, c'est à nouveau l'état médiocre qui est attribué, comme en 2017.
- Grande Rivière de Vieux Habitants – Amont Embouchure (07044007) : station en état « moins que bon » entre 2012 et 2017, son état se dégrade d'autant plus en 2020 en étant associé à un mauvais état.
- Grande Rivière de Vieux Habitants - Prise d'eau (07044250) : l'état mauvais attribué en 2018 est contrebalancé par le bon état déterminé en 2019, mais un état moyen est à nouveau retrouvé en 2020.
- Rivière Nogent - Pont RN (07047007) : station en état « moins que bon » depuis le début du suivi en 2010, son état oscille entre le mauvais état et l'état moyen.
- Rivière Bras de Sable – Ravine Chaude (07049040) : en 2020, cette station atteint pour la première fois du suivi le mauvais état alors que l'année précédente, elle était caractérisée en très bon état. C'est la station qui subit la chute la plus brutale de son état cette année. A surveiller.
- Rivière La Rose - Jardin d'Eau (07050012) : état « moins que bon » en 2017 et 2018, il s'est amélioré ponctuellement en 2019, car l'état médiocre est atteint en 2020. C'est la première atteinte de cet état pour cette station.

Tableau 5 : Richesse des macroinvertébrés benthiques sur les 20 stations du suivi pour la période 2005-2020

SANDRE	Cours d'eau	Station	Bio- typo.	Richesse taxonomique																
				2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
07008015	Grande Rivière de Capesterre	Pont RN	G1	29	20	24	26	27	32	24	30	28	16	-	21	16	12	14	18	
07009010	Rivière du Grand Carbet	Pont RN	G3	-	-	32	36	27	15	20	33	14	18	-	14	18	13	20	14	
07012120	Rivière Bras David	Site INRA	G1	18	-	-	51	41	43	40	49	35	21	-	38	25	13	28	30	
07012220	Rivière Bras David	Maison de la forêt	G2	39	32	45	45	40	41	39	57	25	29	-	36	30	32	22	25	
07016001	Rivière du Galion	Pont Embouchure	G3	-	-	34	24	26	18	21	29	15	17	-	21	25	17	14	21	
07017650	Rivière Grande Anse	Moscou	G3	32	25	36	38	32	17	31	42	34	29	-	23	17	20	26	11	
07021016	Grande Rivière à Goyaves	Amont SIS	G1	30	22	45	38	25	36	41	37	29	23	-	28	27	13	27	24	
07022008	Rivière Grande Plaine	Pont RN	G3	15	5	8	10	4	22	27	37	13	11	-	14	20	15	19	30	
07023495	Rivière aux Herbes	Choisy	G3	35	30	37	37	24	40	30	28	26	23	-	34	24	18	31	24	
07026037	Rivière Lézarde	Diane	G1	20	-	-	48	39	46	51	44	39	37	-	40	37	19	21	34	
07028005	Rivière Moustique	Amont Pont RN1	G1	32	33	43	34	38	50	45	43	31	31	-	34	39	34	44	25	
07028110	Rivière Moustique	Trianon	G2	40	39	41	50	47	48	44	34	37	32	-	38	28	18	31	27	
07032002	Rivière des Pères	Amont Embouchure	G1	26	23	29	31	35	33	36	41	21	20	-	22	26	11	22	26	
07044007	Grande Rivière de Vieux Habitants	Amont Embouchure	G2	20	21	28	24	29	21	43	45	30	38	-	36	22	18	20	15	
07044250	Grande Rivière de Vieux Habitants	Prise d'eau	G2	31	27	45	40	37	39	47	44	22	24	-	31	22	15	32	24	
07046295	Rivière du Plessis	Vanibel	G2	-	-	37	31	32	33	47	57	40	46	-	35	37	23	39	-	
07047007	Rivière Nogent	Pont RN	G2	20	20	29	40	28	36	38	57	33	24	-	39	45	15	30	36	
07048110	Rivière du Premier Bras	Amont Séverin	G1	28	-	-	50	46	53	48	62	45	45	-	44	35	23	46	34	
07049040	Rivière Bras de Sable	Ravine Chaude	G1	14	-	-	48	43	42	49	57	41	29	-	36	32	21	41	30	
07050012	Rivière La Rose	Jardin d'eau	G1	23	-	-	46	46	33	47	51	28	37	-	47	39	28	30	23	

Moyenne	27	25	34	37	33	35	38	44	29	28	-	32	28	19	28	25
Minimum	14	5	8	10	4	15	20	28	13	11	-	14	16	11	14	11
Maximum	40	39	45	51	47	53	51	62	45	46	-	47	45	34	46	36

Tableau 6 : Abondance des macroinvertébrés benthiques sur les 20 stations du suivi pour la période 2005-2020

SANDRE	Cours d'eau	Station	Bio-typo.	Abondance															
				2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
07008015	Grande Rivière de Capesterre	Pont RN	G1	334	439	627	429	228	544	247	254	245	118	-	209	102	67	83	291
07009010	Rivière du Grand Carbet	Pont RN	G3	-	-	2003	1044	740	73	403	321	79	253	-	182	59	83	278	259
07012120	Rivière Bras David	Site INRA	G1	-	-	-	1997	1333	963	1673	1603	535	203	-	518	256	127	435	435
07012220	Rivière Bras David	Maison de la forêt	G2	1470	1124	1576	1787	1602	331	1085	811	77	251	-	412	304	209	160	351
07016001	Rivière du Galion	Pont Embouchure	G3	-	-	1350	345	2038	231	681	547	345	101	-	704	191	86	66	465
07017650	Rivière Grande Anse	Moscou	G3	507	140	457	518	519	39	324	281	118	104	-	71	38	111	209	20
07021016	Grande Rivière à Goyaves	Amont SIS	G1	2014	864	1834	1213	1619	1030	1209	1062	371	332	-	1376	310	241	260	853
07022008	Rivière Grande Plaine	Pont RN	G3	79	20	132	120	88	256	356	573	44	36	-	92	118	203	438	1049
07023495	Rivière aux Herbes	Choisy	G3	2688	1158	2610	1325	1096	1266	456	1409	923	1456	-	3285	705	80	2262	249
07026037	Rivière Lézarde	Diane	G1	-	-	-	1722	1630	1572	1043	601	552	592	-	1259	300	117	139	494
07028005	Rivière Moustique	Amont Pont RN1	G1	1515	728	2625	1188	3656	3207	1595	1204	721	1091	-	731	820	483	2140	606
07028110	Rivière Moustique	Trianon	G2	726	863	637	775	1904	1085	849	322	463	413	-	317	249	943	572	145
07032002	Rivière des Pères	Amont Embouchure	G1	764	562	659	1198	1478	1495	1147	3322	290	188	-	349	564	51	92	2094
07044007	Grande Rivière de Vieux Habitants	Amont Embouchure	G2	404	208	863	1896	1300	368	886	1017	626	604	-	767	197	370	222	291
07044250	Grande Rivière de Vieux Habitants	Prise d'eau	G2	1104	703	3990	981	972	431	1890	1522	175	166	-	233	105	67	376	279
07046295	Rivière du Plessis	Vanibel	G2	-	-	1732	4967	2416	531	3123	3295	1047	2324	-	1270	372	360	1214	-
07047007	Rivière Nogent	Pont RN	G2	406	378	1467	8627	1409	908	692	2541	1055	561	-	1229	1068	84	1012	717
07048110	Rivière du Premier Bras	Amont Séverin	G1	-	-	-	2192	3585	1873	1388	1902	747	920	-	737	448	181	832	298
07049040	Rivière Bras de Sable	Ravine Chaude	G1	-	-	-	3091	1409	449	1501	3412	795	346	-	446	481	77	370	1155
07050012	Rivière La Rose	Jardin d'eau	G1	-	-	-	708	690	250	945	539	129	225	-	532	255	211	471	147

Moyenne	1001	599	1504	1806	1486	845	1075	1327	467	514	-	736	347	207,55	650	611
Minimum	79	20	132	120	88	39	247	254	44	36	-	71	38	51	66	20
Maximum	2688	1158	3990	8627	3656	3207	3123	3412	1055	2324	-	3285	1068	943	2262	2094

Tableau 7 : Notes IBMA pour les 20 stations du suivi pour la période 2005-2020 (les notes IBMA ne peuvent être utilisées pour les données de la période 2005-2009 à cause d'un changement de protocole en 2010)

SANDRE	Cours d'eau	Station	Bio- typo	IBMA											Moyenne 2018-2020
				2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
07008015	Grande Rivière de Capesterre	Pont RN	G1	0,79	0,74	0,66	0,66	0,66	-	0,47	0,33	0,30	0,49	0,46	0,47
07009010	Rivière du Grand Carbet	Pont RN	G3	0,54	0,52	0,73	0,65	0,43	-	0,52	0,71	0,39	0,43	0,44	0,43
07012120	Rivière Bras David	Site INRA	G1	0,78	0,66	0,87	0,87	0,51	-	0,88	0,77	0,29	0,75	0,51	0,63
07012220	Rivière Bras David	Maison de la forêt	G2	0,78	0,86	0,83	0,55	0,67	-	0,80	0,70	0,75	0,64	0,54	0,59
07016001	Rivière du Galion	Pont Embouchure	G3	0,75	0,49	0,78	0,46	0,64	-	0,65	0,74	0,55	0,53	0,46	0,49
07017650	Rivière Grande Anse	Moscou	G3	0,61	0,91	0,85	0,83	0,90	-	0,77	0,60	0,80	0,74	0,44	0,59
07021016	Grande Rivière à Goyaves	Amont SIS	G1	0,38	0,38	0,40	0,42	0,44	-	0,62	0,68	0,30	0,31	0,42	0,37
07022008	Rivière Grande Plaine	Pont RN	G3	0,51	0,62	0,61	0,50	0,43	-	0,60	0,63	0,38	0,32	0,50	0,41
07023495	Rivière aux Herbes	Choisy	G3	0,60	0,46	0,62	0,47	0,45	-	0,65	0,50	0,59	0,45	0,72	0,59
07026037	Rivière Lézarde	Diane	G1	0,47	0,64	0,85	0,84	0,75	-	0,86	0,82	0,51	0,64	0,50	0,57
07028005	Rivière Moustique	Amont Pont RN1	G1	0,64	0,70	0,70	0,58	0,67	-	0,86	0,80	0,47	0,48	0,29	0,39
07028110	Rivière Moustique	Trianon	G2	0,88	0,77	0,72	0,77	0,60	-	0,71	0,83	0,47	0,70	0,69	0,69
07032002	Rivière des Pères	Amont Embouchure	G1	0,49	0,67	0,58	0,52	0,61	-	0,61	0,47	0,55	0,69	0,43	0,56
07044007	Grande Rivière de Vieux Habitants	Amont Embouchure	G2	0,34	0,61	0,48	0,38	0,45	-	0,58	0,44	0,66	0,53	0,19	0,36
07044250	Grande Rivière de Vieux Habitants	Prise d'eau	G2	0,71	0,75	0,79	0,59	0,53	-	0,39	0,67	0,34	0,60	0,58	0,59
07046295	Rivière du Plessis	Vanibel	G2	0,31	0,68	0,71	0,62	0,68	-	0,48	0,72	0,63	0,74	-	-
07047007	Rivière Nogent	Pont RN	G2	0,37	0,43	0,43	0,42	0,23	-	0,37	0,53	0,30	0,38	0,40	0,39
07048110	Rivière du Premier Bras	Amont Séverin	G1	0,96	0,97	0,87	0,82	0,83	-	0,78	0,85	0,45	0,88	0,65	0,77
07049040	Rivière Bras de Sable	Ravine Chaude	G1	0,73	0,72	0,76	0,79	0,55	-	0,84	0,67	0,49	0,75	0,30	0,53
07050012	Rivière La Rose	Jardin d'eau	G1	0,62	0,76	0,80	0,40	0,67	-	0,72	0,50	0,40	0,62	0,27	0,45

Article VI. Conclusion

La campagne RCS 2020 révèle que 3 stations sont en Bon état (16%), 5 stations en Etat moyen (26%), 7 stations en Etat médiocre (37%) et 4 stations en Etat mauvais (21%) (Figure 2). Le bilan proposé cette année est bien plus dégradé que l'année précédente, mais les conditions de prospection sont certainement la cause de ce constat (fin de carême exceptionnellement sec). En effet, moins d'un cinquième des stations échantillonnées est en état au moins bon.




Figure 2 : Répartition des stations selon la qualité écologique indiquée par l'IBMA en 2020

L'influence de l'hydrologie sur les métriques richesse taxonomique et abondance est plus nuancée. En effet, les variations de la richesse taxonomique sont mineures pour la majorité des stations. Seules quatre stations sont caractérisées par une baisse importante de leur diversité. Une diversité bien plus importante est toutefois observée pour deux stations cette année. Il en est de même pour les abondances prélevées : il n'y a pas une tendance générale qui se dégage de cette campagne. Autant de stations sont associées à une abondance plus importante par rapport à 2019, que de stations sont associées à une abondance moindre par rapport à l'année passée.

Enfin, il peut être noté que le nombre de taxons déterminés non pris en compte pour le calcul de l'IBMA est bien moindre par rapport à la campagne précédente. Cela concerne moins de stations (la moitié) et dans des pourcentages de peuplements faibles. Toutefois, la mise à jour préconisée de cet indice lors des précédents suivis est toujours nécessaire ou du moins, la prise en compte du pourcentage du peuplement écarté lors du calcul.

Article VII. Glossaire

Altération : Modification de l'état d'un milieu aquatique ou d'un hydrosystème, allant dans le sens d'une dégradation. Le plus souvent, ces altérations sont dues à des activités humaines, mais elles peuvent aussi être d'origine naturelle.

Anthropisation (perturbation anthropique) : Transformation d'un milieu sous l'action de l'homme, l'éloignant de son état naturel.

Biocénose : Ensemble des organismes vivants (animaux et végétaux dont microorganismes) qui occupent un écosystème donné. Ce groupement d'êtres vivants est caractérisé par une composition spécifique déterminée et par l'existence de phénomènes d'interdépendance. Il occupe un espace que l'on appelle biotope et constitue avec lui l'écosystème. Une biocénose se modifie au cours du temps (phase pionnière, phase intermédiaire et phase d'équilibre).

Biodiversité : Variété du vivant à tous ses niveaux : les gènes, les espèces et les populations, les écosystèmes et les processus naturels qui assurent la perpétuation de la vie sous toutes ses formes.

Bio-indicateur (indicateur biologique) : Indicateur constitué par une espèce (ou un groupe d'espèces) végétale ou animale dont la présence renseigne sur certaines caractéristiques physico-chimiques ou biologiques de l'environnement ou sur l'incidence de certaines pratiques. Les effets sont observables au niveau de l'individu et se traduisent par des altérations morphologiques, comportementales, tissulaires ou physiologiques (croissance et reproduction).

Biote : Ensemble des organismes vivants (la flore, la faune, les champignons, ainsi que les microorganismes tels bactéries, levures, ...) présents dans un habitat (ou biotope). Le biote intègre la description de l'organisation des espèces et de leur richesse spécifique.

Biotope : Espace caractérisé par des facteurs climatiques, géographiques, physiques, morphologiques et géologiques, ..., en équilibre constant ou cyclique et occupé par des organismes qui vivent en association spécifique (biocénose). C'est la composante non vivante (abiotique) de l'écosystème.

Directive Cadre sur l'Eau (DCE) : Directive 2000/60/CE du parlement européen et du conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau. Elle fixe des objectifs environnementaux et des échéances pour améliorer l'état écologique et l'état chimique des masses d'eau de surface, ainsi que l'état quantitatif et l'état chimique des masses d'eau souterraines. La DCE fixe en particulier l'objectif général d'atteindre le « bon état » ou le « bon potentiel » des masses d'eau d'ici 2015, et établit une procédure de planification à cette fin (cycles de gestion de 6 ans : 2010-2015, 2016-2021, 2022-2027, ...).

Ecosystème aquatique (Hydrosystème) : Ecosystème spécifique des milieux aquatiques décrit généralement par les êtres vivants qui en font partie, la nature du lit des berges, les caractéristiques du bassin versant, le régime hydraulique, et les propriétés physico-chimiques de l'eau.

Etat écologique : Appréciation de la structure et du fonctionnement des écosystèmes aquatiques associés aux eaux de surface. Il s'appuie sur des critères appelés éléments de qualité qui peuvent être de nature biologiques (faune, flore), hydromorphologiques ou physico-chimiques. L'état écologique comporte 5 classes : très bon, bon, moyen, médiocre et mauvais. Pour chaque type de masse d'eau, il se caractérise par un écart aux conditions de référence (conditions représentatives d'une eau de surface pas ou très peu influencée par l'activité humaine).

Etat de référence : Etat dans lequel serait un milieu aquatique dans des conditions naturelles ou très proches du naturel, c'est-à-dire non impactées par les activités anthropiques. Cette référence est donc obligatoirement rapportée au type de milieu concerné. Sur le profil longitudinal d'un même hydrosystème, les références pourront donc être très différentes entre les zones amont, médianes et aval.

Hydroécorégion : Zone homogène du point de vue de la géologie, du relief et du climat. C'est l'un des principaux critères utilisés dans la typologie et la délimitation des masses d'eau de surface.

Indice biologique : Indicateur global d'évaluation de l'état du système. Il peut être calculé comme une métrique englobant toutes les fonctionnalités du système pour un groupe animal ou végétal donné (indice monométrique : IBD, IBMR, IBGN, ...) ou comme la combinaison de plusieurs métriques, traduisant alors la synthèse des indications données individuellement par ces métriques (indice multimétrique : I2M2, IPR+, ...).

Indice Biologique Macroinvertébrés Antillais (I.B.M.A.) : Indice développé spécifiquement pour les Antilles Françaises et qui permet d'évaluer la qualité biologique de l'eau d'un cours d'eau au moyen de l'analyse de la faune macroinvertébrée benthique antillaise.

Indice de Diversité : Coefficient traduisant le degré de diversité d'une communauté. L'expression de l'indice de diversité est fonction de deux paramètres : le nombre d'espèces et le nombre d'individus par espèce. Il existe une multitude d'indices mais le plus couramment utilisé est celui de Shannon & Weaver (1949).

Massé d'eau : Portion de cours d'eau, canal, aquifère, plan d'eau ou zone côtière homogène. Il s'agit d'un découpage élémentaire des milieux aquatiques destiné à être l'unité d'évaluation de la Directive Cadre sur l'Eau 2000/60/CE. Une masse d'eau de surface est une partie distincte et significative des eaux de surface, telles qu'un lac, un réservoir, une rivière, un fleuve ou canal, une partie de rivière, de fleuve ou de canal, une eau de transition ou une portion d'eaux côtières. Pour les cours d'eau, la délimitation des masses d'eau est basée principalement sur la taille du cours d'eau et la notion d'hydroécorégion. Les masses d'eau sont regroupées en types homogènes qui servent de base à la définition de la notion de bon état (ou bon potentiel). Une masse d'eau souterraine est un volume distinct d'eau souterraine à l'intérieur d'un ou plusieurs aquifères.

Réseau de Contrôle de Surveillance (RCS) : Réseau de stations de mesure ayant pour vocation, dans le cadre du programme de surveillance de l'état des eaux, d'évaluer l'état général et les tendances d'évolution (à long terme) des eaux du bassin hydrographique, que ces évolutions soient naturelles ou dues aux activités humaines.

Réseau de Contrôle Opérationnel (RCO) : Réseau de stations de mesure permettant, dans le cadre de surveillance de l'état des eaux, d'établir des masses d'eau identifiées comme risquant de ne pas atteindre leurs objectifs environnementaux et d'évaluer l'efficacité des programmes de mesures sur celles-ci.

Richesse spécifique : Nombre d'espèces différentes recensées dans un même échantillon, permettant de mesurer la biodiversité d'un milieu.

Risque de non atteinte du bon état (RNBE) : Risque que les masses d'eau d'un territoire donné ne remplisse pas les objectifs fixés dans la Directive Cadre sur l'Eau.

Source des données : Hydreco, Irstea, SIE et OIEau (www.glossaire.eaufrance.fr)

Article VIII. **Sigles & Abréviations**

DCE : Directive Cadre sur l'Eau

EQR : Ecological Quality Ratio (ou écart à la référence)

I.B.M.A. : Indice Biologique Macroinvertébrés Antillais

ONEMA : Office National des Eaux et des Milieux Aquatiques (devenu AFB, Agence Française de la Biodiversité)

RCO : Réseau de Contrôle Opérationnel

RCS : Réseau de Contrôle de Surveillance

Article IX. **Table des illustrations**

Figure 1 : Carte de qualité de l'état écologique du réseau DCE Guadeloupe en 2020	22
Figure 2 : Répartition des stations selon la qualité écologique indiquée par l'IBMA en 2020	28

Tableau 1 : Coordonnées géodésiques des stations du réseau de suivi DCE Guadeloupe 2020 (correspondance des codes internes avec les codes SANDRE)	16
Tableau 2 : Dates de prélèvement des stations de la DCE 2020	17
Tableau 3 : Richesse spécifique en indice de diversité des peuplements - campagne 2020.....	18
Tableau 4 : Indice Biologique des Macroinvertébrés des Antilles (IBMA) - campagne 2020	19
Tableau 5 : Richesse des macroinvertébrés benthiques sur les 20 stations du suivi pour la période 2005-2020	25
Tableau 6 : Abondance des macroinvertébrés benthiques sur les 20 stations du suivi pour la période 2005-2020	26
Tableau 7 : Notes IBMA pour les 20 stations du suivi pour la période 2005-2020 (les notes IBMA ne peuvent être utilisées pour les données de la période 2005-2009 à cause d'un changement de protocole en 2010).....	27

AFB
Hall C – Le Nadar
5, square Félix Nadar
94300 Vincennes

01 45 14 36 00
www.afbiодiversite.fr

OEG
Immeuble Valkabois
Z.A. Valkanaërs
Route de Grande Savane
97113 GOURBEYRE
05 90 80 99 78
www.eauguadeloupe.com

Avec le soutien financier de

**AGENCE FRANÇAISE
POUR LA BIODIVERSITÉ**
ÉTABLISSEMENT PUBLIC DE L'ÉTAT

www.afbiodiversite.fr



www.eauguadeloupe.com



www.guadeloupe.developpement-durable.gouv.fr